Prise en charge du Syndrome de Détresse Respiratoire Aigue (SDRA) de l'adulte à la phase initiale

Introduction & Définition

- ▶ Processus inflammatoire atteignant les poumons
- ▶ Hypoxémie profonde
- ▶ Diminution de la compliance pulmonaire

Inflammation aigue de la barrière alvéolo-capillaire

Définition du SDRA :

- ▶ Hypoxémie Aigue $PaO_2/FiO_2 < 300$ mmHg
- ▶ Patient ventilé en PEP de 5 cmH₂O au moins
- ▶ Infiltrats radiologiques bilatéraux non expliqués par IC ou surcharge volémique

Evaluation gravité du SDRA

Définition de Berlin

SDRA Léger : $300\text{mmHg} > \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 > 200\text{mmHg}$ † 27 %

SDRA Modéré : $200\text{mmHg} > \text{PaO}_2/\text{FiO}_2 > 100\text{mmHg}$ † 32 %

SDRA Sévère : $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 100\text{mmHg}$ † 45 %

Evaluation de la PEC du SDRA

Réévaluation au minimum toutes les 24h de l'efficacité et de la tolérance

- ▶ Ensemble des Paramètres ventilatoires
- ▶ Ensemble des thérapeutiques

Réglage du volume courant (V_c)

- ▶ Faible volume courant : 6mL/kg de poids idéal en 1^{ère} approche
- ▶ A ne pas augmenter sauf si Hypercapnie importante malgré optimisation paramètres ventilatoires
- ▶ Débit inspiratoire > 50L/min
- ▶ PCO₂ permissive

Pression Expiratoire Positive (PEP)

- ▶ Indispensable : Minimum PEP 5 cmH₂O
- ▶ SDRA Modéré à Sévère : Augmenter PEP

Pression de plateau (Pplat)

- ▶ Monitorer de façon continue la pression de plateau

Objectif : Pplateau << 30cmH₂O

Curarisation

- ▶ Précoce
- ▶ Si $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150 \text{ mmHg}$
- ▶ Perfusion continue (PSE)
- ▶ Durée Max 48h
- ▶ Réévaluation quotidienne

Décubitus Ventral

- ▶ Si $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 150\text{mmHg}$
- ▶ Séances prolongées de 16h

Oxygénation Extra-corporelle (ECMO)

- ▶ SDRA sévère avec $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 80\text{mmHg}$
- ▶ Ventilation Mécanique Dangereuse (Pplat, PEP, Curarisation, DV)

Monoxyde d'Azote Inhalé (NO)

- ▶ Hypoxémie profonde malgré Optimisation des paramètres ventilatoires
- ▶ Avant ECMO
- ▶ De 0,5 à 5,5 ppm, max 10 ppm

Manœuvres de recrutement

- ▶ En cas de dé-recrutement
- ▶ Non systématique
- ▶ Pression Positive Continue pendant 30 à 40sec
- ▶ Ou Augmentation progressive de la PEP
- ▶ Ou Augmentation de la pression motrice

Prise en charge initiale du SDRA en 2019

ECMO veino-veineuse

- Si hypoxémie réfractaire ou ventilation protectrice non applicable
- A discuter avec un centre expert

Modalités de la curarisation : IVSE

- Précocement, dans les 48h du diagnostic

Modalités du décubitus ventral (DV) : [VIDEO](#)

- séance ≥ 16 heures, plusieurs séances

SDRA modéré ou sévère → Test PEP élevée (> 12 cmH₂O)

Utilisation PEP élevée si :

- Amélioration de l'oxygénation
- Sans dégradation significative de la compliance du système respiratoire et de l'hémodynamique
- Maintien Pplateau < 30 cmH₂O, monitoring continu

Critères du SDRA

- PaO₂/FIO₂ ≤ 300 mmHg
- PEP ≥ 5 cmH₂O
- Opacités bilatérales sur l'imagerie thoracique
- Non expliquées par défaillance ventriculaire gauche
- Évolution depuis moins de 7 jours

Traitement possible

- Monoxyde d'azote inhalé (INO), si hypoxémie persistante en DV avant discussion de l'ECMO VV
- Ventilation spontanée après la phase aiguë avec Vt généré autour de 6 ml/kg sans dépasser 8 ml/kg

Pas de recommandation possible

- ECCO₂R
- Pression motrice
- Ventilation spontanée à la phase aiguë

Probablement ne pas faire

- Manœuvres de recrutement systématiques

Ne pas faire

- HFOV

Réévaluation des réglages et de la stratégie de prise en charge au moins toutes les 24h

Poids prédit par la taille

- [Tableau](#)

Merci pour votre attention.