CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE ANDREE ROSEMON
REFERENCE : UF3700/29.a	TITRE : Prise en charge de l'arrêt cardiaque en Réanimation	
Document organisationnel : ☐ Document opérationnel : ☒	SECTEUR EMETTEUR : REANIMATION POLYVALENTE	Page :1/3 Date d'émission : 30/05/2022 Date dernière révision :
Rédaction : Nom : GOURVENNEC Lucie Fonction : IDE Réanimation	Vérification : Nom : THIBAUT Alexis Fonction : IDE Réanimation	Vérification : Nom : HOUCKE Stéphanie Fonction : Médecin Réanimation
Approbation : Nom : ROUFOSSE Françoise Fonction : Cadre de santé Réanimation	Approbation : Nom : KALLEL Hatem Fonction : Chef de service Réanimation	Approbation : Nom : HOUCKE Stéphanie Fonction : Médecin Réanimation
Ont collaboré à la rédaction : Dr HOMMEL D., Dr DJAHI P.		Visa qualité :
Services concernés par application: REANIMATION / USC
Attention, seule la version numérique de ce document fait foi		

I- OBJET

Prise en charge de l'arrêt cardiaque en réanimation.

II- PERSONNES CONCERNÉES

Médecins, internes, infirmiers, aides-soignants.

III- TEXTE DE REFERENCE

- American Heart Association, Fait saillants des lignes directrices 2020 en matière de RCP et de SUC.

REFERENCE : UF3700/29.a	TITRE : Prise en charge de l'arrêt cardiaque en Réanimation	
Document organisationnel : ☐	SECTEUR EMETTEUR : REANIMATION POLYVALENTE	Page :2/3
Document opérationnel : ☒		Date d'émission : 30/05/2022 Date dernière révision :

IV- PROCEDURE

La priorité est d'**ALERTER** et de prendre en charge **RAPIDEMENT** mais ne pas confondre **VITESSE** et **PRECIPITATION** lors d'une situation d'urgence.

Le moins de soignants possible dans la chambre est préférable pour une meilleure organisation et fluidité de l'action :

- Un/e médecin est le **LEADER médical**,
- L'IDE référent/e du patient est le **LEADER paramédical** et dédié/e aux **drogues** OU à la **ventilation**,
- Un/e IDE aux **drogues** OU à la **ventilation**,
- Un/e IDE ou AS **circulant/e**,
- DEUX/TROIS soignants pour le **relais du MCE**.

Les étapes à suivre sont à réaliser en EQUIPE :

- Appel réanimateur → **4570**
- Apporter le chariot d'urgence au plus près du patient sans gêner le déroulement du soin,
- Mettre le lit en position allongée stricte et dégonfler le matelas → tirer sur la poignet RCP présente sur les matelas,
- Mettre le plan dur sous le patient,
- Déclencher le chronomètre sur le scope → il est important et nécessaire d'avoir une notion de temps,
- Commencer la RCP → 30 compressions thoraciques ET relais de soignants pour le massage cardiaque externe,

- Ventilation :

Patient intubé

**Mettre le ventilateur en VAC
FiO2 100%**

Patient non intubé

**2 insufflations au BAVU
Préparation du matériel d'IOT**

- Vérification de la voie d'abord
- Préparation des drogues d'urgence :
 - ADRENALINE** : Pur → 1mg toutes les 3 à 5 minutes
 - AMIODARONE** : Pur → 300mg pour la 1^{ère} dose // 150mg pour la 2^{ème} dose
 - ou
 - LIDOCAINE** : Pur → 1-1,5mg/kg pour la 1^{ère} dose // 0.5-0.75mg/kg pour la 2^{ème} dose

LES DROGUES SONT A INJECTER SUR ORDRE DU MEDECIN LEADER DE LA REANIMATION

- Suivre l'organigramme de la prise en charge de l'ACR,
- Consigner les traitements sur la feuille de surveillance.

Qualité de la RCR

- Pousser fort (à une profondeur d'au moins 5 cm [2 pouces]) et vite (100 à 120/min) et permettez la relaxation thoracique totale.
- Minimisez les interruptions pendant les compressions.
- Évitez la ventilation excessive.
- Changez de secouriste effectuant les compressions toutes les 2 minutes, ou plus souvent en cas de fatigue.
- Sans intubation, rapport compressions/ventilations de 30 pour 2.
- Capnographie quantitative à ondes – Si le PETCO₂ est faible ou en baisse, réévaluez la qualité de la RCR.

Énergie de choc utilisée pour la défibrillation

- **Biphasique** : Recommandation du fabricant (p. ex., dose initiale de 120 à 200 J); en l'absence de recommandations, administrez la dose maximale. La deuxième dose et les doses subséquentes doivent être équivalentes, et des doses plus élevées peuvent être envisagées.
- **Monophasique** : 360 J

Traitement médicamenteux

- **Dose IV/IO d'adrénaline** : 1 mg toutes les 3 à 5 minutes
- **Dose IV/IO d'amiodarone** : Dose initiale : Bolus de 300 mg
Deuxième dose : 150 mg.
ou
Dose IV/IO de lidocaïne : Dose initiale : 1 à 1,5 mg/kg
Deuxième dose : 0,5 à 0,75 mg/kg

Intubation

- Intubation supralaryngée ou endotrachéale
- Capnographie à ondes ou capnométrie pour confirmer et surveiller le positionnement de la sonde d'intubation endotrachéale
- Dès que le dispositif d'intubation est en place, administrez 1 ventilation toutes les 6 secondes (10 ventilations/min) en pratiquant des compressions thoraciques continues

Retour à la circulation spontanée (RCS)

- Pouls et tension artérielle
- Augmentation soudaine et durable de PETCO₂ (typiquement ≥ 40 mm Hg)
- Ondes spontanées de tension artérielle avec surveillance intra-artérielle

Causes réversibles

- Hypovolémie
- Hypoxie
- Ion hydrogène (acidose)
- Hypo-/hyperkaliémie
- Hypothermie
- Pneumothorax sous tension
- Tamponnade cardiaque
- Toxines
- Thrombose pulmonaire
- Thrombose coronaire